

PÂTURAGE

UN IMPACT SUR LA BIODIVERSITÉ,
LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET LES PAYSAGES

Une **prairie** est une zone d'herbage (graminées et légumineuses principalement) destinée à l'alimentation animale, via le pâturage ou la fauche. Les prairies représentent un **habitat naturel**, une zone de nidification ou d'alimentation pour la faune locale.



8 250 000 ha

de surface toujours en herbe
en France (Agreste, 2017)



1 ha

de surface pâturée en moyenne
par un équidé (IFCE - OESC, 2017)

LE PÂTURAGE DES ÉQUIDÉS EST CONDITIONNÉ PAR LEURS SPÉCIFICITÉS :

CAPACITÉ D'INGESTION

Les équidés ne sont pas limités par la durée de rumination ou par la taille du rumen. Ils peuvent pâturer plus longtemps qu'un bovin au cours d'une journée et sont moins impactés par la qualité nutritionnelle des aliments.

PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES


Les équidés semblent préférer l'herbe jeune. En cas de pénurie, ils se dirigent plus volontiers que les bovins vers les espèces moins appétentes.

MORPHOLOGIE

Leurs incisives sur la mâchoire du haut et du bas permettent un pâturage ras et privilégient l'ingestion des protéines facilement digestibles des jeunes pousses.

PHYSIOLOGIE

L'absence de rumen des équidés limite leurs émissions de méthane par rapport aux bovins.



Les prairies pâturées uniquement par des équins ont une structure hétérogène, ce qui crée des niches écologiques et favorise la compétition interspécifique. **Maintenir des prairies c'est maintenir des stocks de carbone.**

Ce pâturage hétérogène peut cependant produire des zones rases et des zones de refus, menant à l'embroussaillage. Il est possible d'établir une **conduite de pâturage raisonnée** en mettant en place le **pâturage tournant** ou le **pâturage de fin de saison**. Le **pâturage mixte** peut également être une piste de réflexion.

Les équins et les bovins ont une morphologie, une physiologie et un comportement au pâturage différents. Ils vont donc consommer des espèces végétales différentes. Les bovins n'ayant pas d'incisives supérieures, ils sont incapables de prélever l'herbe courte. Les équidés peuvent ainsi valoriser ces zones.

Le **pâturage mixte** est donc un outil de gestion des pâtures. Il peut réduire la charge de travail de l'exploitant, permettre un meilleur contrôle des ligneux, et améliorer la valeur nutritive de la prairie.

Connaissances