


Halte à la gourme

La gourme est une maladie très contagieuse due à *Streptococcus equi* subsp. *equi*, bactérie très résistante.

Symptômes évocateurs : Abattement avec jetage séreux > jetage purulent > œdème et abcès ganglionnaires.

- Touche surtout les jeunes chevaux : 1 à 5 ans
- Favorisée par forte concentration et mouvements de chevaux.
- 70 % des chevaux guéris développent une immunité à long terme.



Prévention

- Quarantaine à l'introduction
- Dépistage ou vaccination dans les contextes à risque
- Matériel individuel

Lutte

Caractéristique de la bactérie

Résistance	Transmission	Contagion
+++ ↓	<ul style="list-style-type: none"> • Indirecte • Directe +++ ++ ↓ ↓	Plusieurs mois dans les poches gutturales +++ ↓
Nettoyage/désinfection des locaux et du matériel  Jetage, pus des abcès...	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un circuit de soins - Hygiène du personnel vecteur potentiel de la bactérie - Arrêt des mouvements 	Isolement jusqu'à disparition des symptômes  Aux porteurs asymptomatiques : dépistage par sérologie + PCR sur lavage poches gutturales

Vaccination par voie intralabiale à réserver aux situations à risque en raison de la faible immunité : deux injections à 1 mois d'intervalle, puis un rappel tous les 3 mois, après la 1ère injection selon la pression d'infection.



équi-paedia
l'encyclopédie pratique du cheval



Plus d'information sur www.equipaedia.fr