

Halte à la teigne

Mycose cutanée fréquente et très contagieuse chez les équidés.

Dépilations rondes caractéristiques :

- Elévations des poils sur 2 à 6 cm de diamètre
 > dépilations rondes > plaques
- Pas de démangeaisons

Contagieuse pour l'homme : toute lésion cutanée circulaire doit alarmer.



Prévention


Mesures d'hygiène strictes

- Matériel de pansage, tapis et couvertures individualisés
- Nettoyage et lavages réguliers avec fongicides
- Harnachement individualisé ou fréquemment nettoyé (éponge ou pulvérisateur avec solution anti-fongique)

Lutte

Caractéristique du virus

Résistance



Nettoyage/désinfection
 des locaux et du matériel


Transmission

- Indirecte
 - Directe
-

- Mise en place d'un circuit
 de soins
 - Hygiène du personnel
 vecteur potentiel du virus

Contagion

Jusqu'à guérison complète



Isolement
 jusqu'à la fin du traitement

Traitement : 4 traitements (éponge ou pulvérisateur), à 3 ou 4 jour d'intervalles, selon la prescription du vétérinaire. Traiter l'ensemble du corps de tous les animaux en contact avec un animal atteint.



équi-paedia
 l'encyclopédie pratique
 du cheval

